

Kohlrabi und Bodenkohlrabi Sichtung 2011

Ein Projekt im Rahmen des Nationalen Aktionsplanes, unterstützt vom Bundesamt für Landwirtschaft

Projektleitung Artha Samen:
-Jürg Hädrich
Schwand
3110 Münsingen



04-NAP-P85
Artha Samen
Sortengarten Bio-Schwand

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|--|------|
| 1. | Einleitung und Dank | 3 |
| 2. | Standort Sortensichtung | 4 |
| 3. | Kulturgeschichte | 5 |
| 3.1 | Entstehung der Kulturformen | 5 |
| 3.2 | Sortenübersicht der Roten Rüben..... | 5 |
| 4 | Der Sichtungsgarten | 7 |
| 4.1 | Anbau 2010 | 7 |
| 4.2 | Kulturdaten | 7 |
| 4.3 | Auftretende Probleme | 7 |
| 4.4 | Bonituren | 7 |
| 4.5 | Besichtigungen | 7 |
| 4.6 | Auswertung | 7 |
| 4.7 | Vorschläge | 7 |
| 4.8 | Weiteres Vorgehen | 7 |
| 4.9 | Auszüge aus den UPOV Richtlinien..... | 8-14 |
| 4.10 | Aussaatlisten | 15 |
| 4.11 | Bewertungscode | 17 |
| 4.12 | Krankheiten | 18 |
| 4.13 | Anbauplan | 19 |
| 5. | Sortenbeschreibungen | 20 |
| 5.1 | Sortenblätter | 20 |
| 5.2 | Bewertungskriterien für die Kohlrabi nach UPO..... | 66 |
| 5.3 | Bewertungskriterien für Bodenkohlrabi nach UPOV..... | 67 |
| 5.4 | Bonituren Kohlrabi..... | 70 |
| 5.5 | Bonituren Bodenkohlrabi..... | 71 |
| 5.6 | Empfehlungen..... | 72 |
| 5.7 | Blattmessungen Bodenkohlrabi..... | 74 |
| 5.7. | Illustrationen | 75 |

1. Einleitung und Dank

Die pflanzengenetischen Ressourcen – eine der grundlegendsten und unabkömmlichsten Ressourcen unseres Planeten – sind stark gefährdet. Ihr Verlust wird jeden von uns treffen und zukünftige Generationen gefährden. Dem entgegen zu treten gehört zu den grossen globalen Herausforderungen der heutigen Zeit.

Im Anschluss zur Konferenz der Vereinten Nationen von 1992 in Rio über Umwelt und Entwicklung (Verabschiedung der Agenda 21, Konvention über die biologische Vielfalt) wurde vereinbart, unter der Führung Kommission für pflanzengenetische Ressourcen der FAO (Organisation für Ernährung und Landwirtschaft), einen Bericht über den Weltzustand der phyto-genetischen Ressourcen in der Ernährung und Landwirtschaft sowie einen globalen Aktionsplan zu erstellen.

Anlässlich der 4. internationalen technischen Konferenz über pflanzengenetische Ressourcen vom 17.-23. Juni 1996 in Leipzig wurde von 150 Ländern, darunter die Schweiz, der Weltzustandsbericht und der globale Aktionsplan verabschiedet.

Im Auftrag des Bundesrates hat das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Kommission zur Erhaltung der Kulturpflanzen (SKEK) einen nationalen Aktionsplan (NAP) erstellt. Dieser wurde 1997 vom Bundesrat verabschiedet. Der NAP bezweckt die Umsetzung des globalen Aktionsplanes der FAO in der Schweiz zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft.

Seit 1999 unterstützt das BLW Projekte zur langfristigen Erhaltung und Nutzung der Artenvielfalt bei Kulturpflanzen.

Der Sichtungsgarten Schloss Oberhofen und der Sortengarten Schwand Münsingen 04-NAP-P85 ist ein Projekt von Artha Samen, unterstützt durch das Bundesamt für Landwirtschaft. Dieses Projekt soll dazu beitragen, die Qualität, Substanz und Langfristigkeit bei der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der genetischen Ressourcen von Gemüse in der Schweiz sicher zu stellen. Die vorliegenden Ergebnisse präsentieren die Randensichtung während der Versuchsperiode 2010

Im Sichtungsgarten wurden dieses Jahr 16 Kohlrabi und 7 Bodenkohlrabi gesichtet. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und analysiert.

2. Standort der Sichtung

Die Sichtung wurde auf dem Schwand bei Münsingen durchgeführt. Auf dem mittelschweren sandigen Lehmboden wurde das Versuchsfeld eingerichtet. Als Vorkultur im vorhergehenden Jahr waren dort Schnittblumen angebaut und im Frühjahr für kurze Zeit Phacelia Gründüngung.



Wir haben über Setzlingsanzucht Jungpflanzen produziert.

Pro Sorte wurden hundert Stück pickiert und je 25 Aufgepflanzt auf zwei Flächen. Die eine gemäss Sortentabelle der Reihe nach und die zweite nach dem Zufallsprinzip.



Zur Zeit der Pflanzung herrschte heisses und trockenes Wetter. Zweimaliges Angiessen war nötig damit die Pflanzen gut anwachsen konnten.



3. Kulturgeschichte

3.1 Die Entstehung der Kulturformen

Botanisch gesehen entstammen sie einer grossen Gattung, von der uns hier allerdings nur wenige Arten interessieren. Generell lassen sich die Brassica Nutzformen nach den verwendeten Pflanzenorganen einteilen: in die sich im Erdreich entwickelnden Rüben und die aus den oberirdischen Teilen gewonnenen Gemüsekohle. Die zahlreichen unterschiedlichen Kohl-Rüben leiten sich über viele Zwischentrufen der Kreuzung und Selektion ab von den Wilden Rübsen, *Brassica rapa* L. ssp. *Campestris*, sowie verschiedenen anderen Brassica-Arten und -Varietäten, darunter auch dem als Öllieferant seit langem bekannten Raps. Eine Unterart, die Kohl- oder Steckrübe, *Brassica napus* L. ssp. *rapifera*, weist eine Verdickung im unteren Stengelbereich auf. Daneben existiert noch eine weitere Rübenart, die als Stoppel- oder Wasser-Rübe, *Brassica rapa* L. ssp. *rapa*, bezeichnet und ebenfalls schon lange kultiviert wird. Die Unterscheidung von Napen und Rapen in historischen Dokumenten oder auf Bildern ist häufig nicht eindeutig möglich. Nach ihrer Verwendung können die Rüben in die zumeist weissfleischigen Futter- und die gelbfleischigen Speiserüben eingeteilt werden, sind aber streng zu unterscheiden von jenen Rüben, die der Gattung *Beta* zuzurechnen sind.

Die Kohlrüben besaßen im Volk keine hohe Wertschätzung als Nahrungsmittel, waren jedoch in Mangelzeiten oftmals Retter in der Not. Dennoch finden sich unter ihnen auch sehr wohlschmeckende Sorten, die sich noch heute grosser Beliebtheit erfreuen und manchen Speisen ihren charakteristischen Geschmack verleihen.

3.2 Sortenübersicht der Kohlrabi

Weisse und blaue Sorten

Die Kohlrabi stammen wohl aus dem 15. - 16. Jahrhundert und sind somit ein eher junges Gemüse. Botanisch betrachtet handelt es sich beim Kohlrabi um eine oberirdische Sprossknolle, aus der die Laubblätter entspringen. Die etwas plattgedrückte, ründliche Knolle, die seit dem 16. Jahrhundert grössere Bedeutung für die Küche erhielt, kann als Gemüse oder als Rohkost zubereitet werden, in verschiedenen Gegenden werden zusätzlich auch die Blätter verwendet.

Andrieux Vilmorin beschreibt in seinen Aufzeichnungen von 1897 "Der Gemüsegarten" lediglich drei Kohlrabi. Damals waren weisse und blaue Variationen bekannt: *Blanc Hâtive de Vienne* und *Violette Hâtif de Vienne*, eine weitere weisse Sorte war unter dem Namen *Neapolitane* bekannt, die Broccoli artige Blätter hatte. Als selten wird noch eine vierte Sorte erwähnt, die artischokenartige Blätter hatte.

Weisse Sorten: Lanro, Trero, Delikatess weiss, Superschmelz, Express Forcer, Noriko

Blaue Sorten: Azur Star, Blaro Roggli, Delikatess violett, Blaril, Dyna,

3.3 Sortenübersicht der Bodenkohlrabi

Bei den Bodenkohlrabi (*Brassica napus* L. var. *napobrassica*) waren früher in grosser Sortenvielfalt verbreitet. Sie dienten wohl neben der menschlichen Ernährung auch als Futter für das Vieh, Schweine und andere Haustiere. In den Aufzeichnungen von Andrieux Vilmorin sind eine ganze Reihe von Sorten aufgeführt, die heute nicht mehr aufzufinden sind. In dieser Hinsicht müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass ein grosses Sortensterben statt gefunden hat. Nur noch wenige Sorten sind auf dem Markt und wie die vorliegende Sichtung zeigt, sind die Sortenunterschiede sehr gering.

Heute noch erhältliche Sorten:

Gelbe Schmalz, Ostgota, du Brassus, Perfektion, Jaune Burre, Gelbe, Blanc dur d'hiver.

Verschwundene alte Sorten:

Weisse Schwedische, rote Schwedische, gelbe Schwedische, grüne Schwedische, Lutton's Champion (violetter Kopf), Border Imperial, Jaune de Montmagny, jaune de Finlande, rouge plait Hâtif, Rave du Limousin, Rutabaga de Skirving, Noire roud en plat, Boule d'or, de Norfolk blanc, Jaune de Robertson.

Weisse Sorten



Blaue Sorten



4. Sichtungsgarten

4.1 Anbau 2011

Für das Anbaujahr 2011 wurden von der Schweizerischen Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen (SKEK) Kohlrabi (*Brassica oleracea* ssp. *oleracea*) und Bodenkohlrabi (*Brassica napus*) zur Sortensichtung ausgewählt.

Im Sichtungsgarten wurden 23 verschiedene Akzessionen inkl. Referenzsorten ausgesät. Hauptsächlich stammen sie von der Genbank in Changins, Pro Specie Rara, Sativa, Artha Samen und aus dem Handel.

4.2 Kulturdaten

- Ausgesät wurde am 17. Mai 2011
- Pikiert: 22. Mai 2011
- Die Pflanzung erfolgte am 15. Juni 2011
- Bonituren in mehreren Durchgängen von Juli bis September.

4.3 Auftretende Probleme

- Während der Kultur im Freiland traten keine nennenswerten Probleme auf.

4.4 Bonituren

- Die Bonituren erfolgen nach UPOV-Richtlinien.
- Die Bonituren wurden von Jürg Hädrich, Manuel Lüthi und Regina Reusser vorgenommen.

4.5 Besichtigungen / Führungen

- 14.08.2010 : Öffentliche Führung
- 03.09.2010: Öffentliche Führung
- 14.09.2010: Besichtigung mit den Mitgliedern der AG Gemüse der SKEK
- 15.09.2010: Öffentliche Führung

4.6 Auswertung

- Zusammenfassung der Einzelbonituren durch Artha Samen.
- Ermitteln von Mittelwerten der Messungen betreffend Blattlänge, Blattbreite, Wurzeldurchmesser und Länge der Wurzel, Länge des Pseudostammes bei den Bodenkohlrüben.
- Erstellen von ausführlichen Sortenblättern durch Artha Samen

4.7 Vorschläge


- Die besten Akzessionen werden rein erhalten
- Ähnliche Akzessionen mit mittlerem Marktwert und vergleichbarer Ausgeglichenheit werden zusammengefasst (geramscht)
- Schlecht ausgeglichene Akzessionen ohne Züchtungspotenzial und Sortengemische werden nicht weiter erhalten, nicht erhalten werden auch Sorten mit grosser Anfälligkeit auf Krankheiten oder Schädlinge.
- Handelssorten, deren Verbleib mittelfristig gewährleistet ist, werden nicht erhalten.
- Gute Handelssorten, deren Verbleib im Sortiment gefährdet ist, werden erhalten.
- Die Bodenkohlrabi sind mit Ausnahme von Oesgota alle sehr ähnlich mit minimalen Unterschieden. Solange keine Genanalysen vorliegen sollten die Sorten nicht geramscht werden.

4.8 Weiteres Vorgehen


- Weiterleiten der Vorschläge aus den Bonituren an die Arbeitsgruppe Gemüse (AGG) der SKEK.

4.9 Auszüge aus den UPOV Richtlinien

K03 Blattstiele: Überschlagen



1
fehlend




9
vorhanden

K04, K08, K09 Blattstiel Länge und Blattspreite: Länge und Breite


Zu 4: Blattstiel: Länge

Zu 8 und 9: Blattspreite: Länge und Breite




4.9 Auszüge aus den UPOV Richtlinien

K010 Blattspreite: Form des oberen Teils




K011-K013: Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (11), Randeinschnitte (12 und 13)



1 = Einschnitte bis zur Mittelrippe

4.9 Auszüge aus den UPOV Richtlinien

K019: Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter



3
gering




5
mittel




7
groß


Zu 21: Kohlrabi: Form (im Längsschnitt)



1
quer schmal elliptisch



2
quer elliptisch



3
quer breit elliptisch



4
rund



5
breit elliptisch

4.9 Auszüge aus den UPOV Richtlinien

K022: Kohlrabi: Form des oberen Endes

Zu 22: Kohlrabi: Form des oberen Endes



3
ingesunken



5
eben




7
vorgewölbt

Zu 23: Erntereife


Die Erntereife gilt als erreicht, wenn 50% der Kohlrabi einen Durchmesser von 7 cm im Gewächshaus oder von 8 cm im freien Feld erreicht haben.

4.9 Auszüge aus den UPOV Richtlinien

K03: Blatt : Lappung



1
fehlend




2
vorhanden



Teile der Blattspreite werden als Lappen angesehen, wenn ihre Länge mindestens der Breite des Blattstiels an ihrer Ansatzstelle entspricht und wenn der obere Einschnitt der Spreite mindestens die Hälfte der Länge des Lappens ausmacht.

K04-K08 Blattmerkmale, Lappen und Endlappen




4. Blatt: Anzahl Lappen
(An einer Seite der Mittelrippe ohne Endlappen zu erfassen)

Ein Lappen ist definiert als Blattgewebe, das länger als 2 cm ist und auf beiden Seiten wenigstens bis zur Hälfte der Entfernung zur Mittelrippe eingeschnitten ist.


5. Blatt: Länge des Endlappens
6. Blatt: Breite des Endlappens
7. Blatt: Länge
8. Blatt: Breite

4.9 Auszüge aus den UPOV Richtlinien

K010 Blattstiel: Haltung




K016: Rube: Form im Längsschnitt



K019: Pseudostamm: Länge



Zu 19: Pseudostamm: Länge



Die Anzucht der Kohlrabi und Bodenkohlraben erfolgte gleichzeitig über eine Aussaat in Saatschalen, anschliessend wurden sie einzeln pikiert in Quickpot.



Aussaat: 17.05.2011



Pflanzung: 15.06.2011



Bonitierung auf dem Feld: ab August

4.10 Aussaatliste

Von der Arbeitsgruppe Gemüse im Februar 2011 vorgeschlagene Sichtungsliste:



2011

Sichtung von Kohlrabi und Bodenkohlrabi

Brassica oleracea ssp *oleracea* convar *acephala* var *gongyloides*; *Brassica napus* ssp *napobrassica*

Von der Arbeitsgruppe Gemüse im März 201 vorgeschlagene Sichtungsliste

| Nr. | Accennumb | Gattung | Sorte | Donneur | Genre | ESPECE |
|-----|-----------|---------------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| 1 | ko44 | Kohlrabi | Azur Star | Sativa | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 2 | 89.6397 | Kohlrabi | Blaro Roggli | RAC | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 3 | GE-1981 | Kohlrabi | Blaro Roggli | PSR | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 4 | Wyss | Kohlrabi | Blaro | Handel/ Referenzsorte | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 5 | 98.6410 | Kohlrabi | Trero | RAC | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 6 | Ko45 | Kohlrabi | Trero (Hädrich) | Sativa | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 7 | 89.6409 | Kohlrabi | Lanro | RAC | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 8 | ko47 | Kohlrabi | Lanro | Sativa | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 9 | Wyss | Kohlrabi | Lanro | Handel/ Referenzsorte | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 10 | 89.6396 | Kohlrabi | Delikatesse, violett | RAC | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 11 | 89.6395 | Kohlrabi | Delikatesse, weiss | RAC | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 12 | GE-1291 | Kohlrabi | Delikatesse, blauer | PSR | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 13 | ko40 | Kohlrabi | Blaril (Hädrich) | Sativa | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 14 | ko48 | Kohlrabi | Dyna | Sativa | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 15 | Wyss | Kohlrabi | Superschmelz | Handel/ Referenzsorte | Brassica | <i>oleracea</i> ssp <i>oleracea</i> |
| 16 | 87.5639 | Bodenkohlrabi | du Brassus | RAC | Brassica | napus |
| 17 | 89.6398 | Bodenkohlrabi | Perfektion | RAC | Brassica | napus |
| 18 | 89.6353 | Bodenkohlrabi | Oestgota | RAC | Brassica | napus |
| 19 | 89.6407 | Bodenkohlrabi | Jaune Beurre | RAC | Brassica | napus |
| 20 | GE-1576 | Bodenkohlrabi | Gelb | PSR | Brassica | napus |
| 21 | GE-1163 | Bodenkohlrabi | Blanc dur d'hiver | PSR | Brassica | napus |
| 22 | Bigler | Bodenkohlrabi | Gelbe Schmalz | Handel/ Referenzsorte | Brassica | napus |
| 23 | Artha | Kohlrabi | Delikatesse, blauer | Artha | Brassica | napus |



4.11 Bewertungscode:

A Akzession erhalten

Wertvolle Akzession. Akzession nicht mehr im Handel. Züchtungs-potenzial, Anbaueignung für die Schweiz oder andere bevorzugte Merkmale (Marktwert, Ausgeglichenheit, Geschmack, Resistenzen, Nährwert) vorhanden. Die Akzession erfüllt die Bedingungen der Positivliste und wird für diese bestätigt. Kuriosität. Die Akzession gilt als Kuriosität und wird als solche auf die Positivliste gesetzt.

B Ramschen

Akzession mit wenig Eigencharakter. Akzession nicht mehr im Handel. Die Akzession erfüllt die Bedingungen der Positivliste. Ähnliche Akzessionen mit mittlerem Marktwert und vergleichbarer Ausgeglichenheit werden zusammengemischt (ramschen), als Gruppe erhalten und als solche für die Positivliste bestätigt.

C Streichen

Schlechte Akzessionseigenschaften. Schlecht ausgeglichene Akzession mit geringem Zuchtpotenzial oder Sortengemische. Anfällige Akzession (Krankheiten und/oder Schädlinge), unbefriedigende Kultureigenschaften und ungenügende Qualität des Endproduktes. Bei gleichen Sorten sind bessere Akzessionen vorhanden. Die Akzession wird von der Positivliste gestrichen.

D Handelssorte. Monitoring

Handelssorte zum erhalten. Gute Sorte, die noch im Handel ist, deren Verbleib im Samenhandel aber gefährdet ist. Diese Sorten werden von umsatzstarken, weltweit verkauften Sorten verdrängt (Saatgutproblematik). Ein aktives Monitoring ist hier unumgänglich. Die Sorte erfüllt voraussichtlich die Bedingungen der Positivliste. Erneute Beurteilung und Entscheid über eine Positivlistenberechtigung bei Beendigung des Handels.

E Ausländische Handelssorte

Standardsorten des Saatguthandels. Die Verfügbarkeit von Saatgut ist mittelfristig gewährleistet.

F Sanierung

Phytosanitäre Sanierung notwendig. Aus dem in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführten Grund muss diese Akzession in ein phytosanitäres Sanierungsprogramm.

G Akzessionsname ändern

Akzessionsname innkorrekt. Aus dem in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführten Grund ist bei dieser Akzession der Akzessionsname zu ändern. Die Änderung wurde bereits ausgeführt oder ein Vorschlag ist ebenda gemacht.

H Keine Bewertung

Bewertung nicht möglich. Aus dem in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführten Grund war bei dieser Akzession keine Bewertung möglich. Vorschläge für das weitere Vorgehen werden ebenda erwähnt.

4.12 Krankheiten

Es sind keine Krankheiten aufgetreten mit Ausnahme von Mehltau bei der Kohlrüben Sorte Oestgota. Bei den Kohlrabi waren alle Akzessionen gesund.



4.13 Anbauplan

Anbauplan Kohlrabi und Bodenkohlrabi Sichtung Schwand Münsingen

Pflanzung:



Sichtung nach Nr.

Random / Wiederholung

| Rand Bikores Schweizer | | | | | | | | | | Rand Mongerm | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|----|----|----|---------------|----|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|
| Gelbe Schmalz | | | | | Rand | | | | | Gelbe Schmalz | | | | | Gelbe Schmalz | | | | | |
| 5 | Trero RAC 98.6410 | 10 Delikatesse violett RAC 89.6396 | 15 Superschmelz Wyss Ref. | 20 Gelb PSR GE- 1576 | | | 6 | 14 | 1 | 17 | 19 | | | | | | | | | |
| 4 | Blaro Wyss Referenz | 9 Lanro Wyss Referenzs. | 14 Dyna Ko48 Sativa | 19 Jaune Beurre RAC 89.6407 | | | 20 | 7 | 5 | 12 | 15 | | | | | | | | | |
| 3 | Blaro Roggli GE- 1981 | 8 Lanro Ko47 | 13 Blaril Ko40 Sativa | 18 Ostgota RAC 89.6353 | 23 Blaue Delikatesse Artha 17029 | | 8 | 18 | 21 | 11 | 23 | | | | | | | | | |
| 2 | Blaro Roggli 89.6397 | 7 Lanro RAC 89.6409 | 12 Delikatess blau PSR GE-1291 | 17 Perfektion RAC 89.6398 | 22 Gelbe Schmalz Bigler Ref. | | 22 | 16 | 10 | 9 | | | | | | | | | | |
| 1 | Azur Star Sativa Ko 44 | 6 Trero Sativa Ko45 | 11 Delikatesse weiss RAC 89.6395 | 16 du Brassus RAC 87.5639 | 21 Blanc dur d'hiver PSR GE-1163 | | 4 | 2 | 13 | 3 | | | | | | | | | | |
| Gelbe Schmalz | | | | | Rand | | | | | Gelbe Schmalz | | | | | Gelbe Schmalz | | | | | |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 1 Azur Star | Ko44 | SAT |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Rand- einschnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 1 Azur Star | Ko44 | SAT |

Bemerkungen:

Eigenständige Sorte mit hohem Stiel unterhalb der Knolle, Frühreif und geeignet für Zucht.

Erhaltungstatus: A

Empfehlungen:

Als eigenständige Sorte erhalten.



Blattspreite:

| KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 3 | 5 | 3 | 9 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 | KO25 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 2 Blaro Roggli | 89.6397 | RAC |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Randein- schnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 2 Blaro Roggli | 89.6397 | RAC |

Bemerkungen:

Frühe Sorte mit sehr guten Eigenschaften, unbedingt erhalten für die Züchtung wertvoll. Ramschen mit GE-1981.

Erhaltungstatus: B

Empfehlungen:

Ramschen mit GE-1981



Blattspreite:

| KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|---|--|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenig hell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 3 | 5 | 3 | 9 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 | KO25 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 |

Sortenblätter

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 3 Blaro Roggli | GE-1981 | PSR |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Rand- einschnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 3 Blaro Roggli | GE-1981 | PSR |

Bemerkungen:

Frühe Sorte mit sehr guten Eigenschaften, unbedingt erhalten für die Züchtung wertvoll.
Ramschen mit RAC 89.6397

Erhaltungstatus: B

Empfehlungen:

Ramschen mit RAC 89.6397



Blattspreite:

| KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|---|--|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenig hell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 3 | 5 | 3 | 9 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 | KO25 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 4 Blaro | Handelssorte | Wyss |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schritte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Randein- schnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 4 Blaro | Handelssorte | Wyss |

Bemerkungen:

Handelssorte, im Erscheinungsbild sehr ähnlich wie die Herkünfte von Roggli RAC und PSR.

Erhaltungstatus: D

Empfehlungen:

Die Sorte ist noch im Handel erhältlich.



Blattspreite:

| K015 | K016 | K017 | K018 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 3 | 5 | 3 | 9 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| K019 | K020 | K021 | K022 | K023 | K024 | K025 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 5 Trero | 98.6410 | RAC |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Rand- einschnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 5 Trero | 98.6410 | RAC |

Bemerkungen:

Schöner ovaler und frühreifer Kohlrabi, unbedingt erhalten und Ramschen mit Ko45.
Gutes Zuchtpotenzeal.

Erhaltungstatus: B

Empfehlungen:

Ramschen mit Ko45.



Blattspreite:

| KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 3 | 5 | 2 | 7 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 | KO25 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 |

Sortenblätter

| | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 6 Trero (Hädrich) | Ko45 | SAT |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Rand- einschnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 6 Trero (Hädrich) | Ko45 | SAT |

Bemerkungen:

Schöner ovaler und frühreifer Kohlrabi, unbedingt erhalten und Ramschen mit RAC 98.6410
Gutes Zuchtpotenzial.

Erhaltungstatus: B

Empfehlungen:

Ramschen mit RAC 98.6410



Blattspreite:


| KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 3 | 5 | 2 | 7 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 | KO25 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 7 Lanro | 89.6409 | RAC |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Rand- einschnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 7 Lanro | 89.6409 | RAC |

Bemerkungen:

Sehr früher Kohlrabi der sich deutlich von Trero unterscheidet, unbedingt erhalten. Ramschen mit Ko47. Hohes Zuchtpotenzial.

Erhaltungstatus: B

Empfehlungen:

Ramschen mit Ko47.



Blattspreite:

| K015 | K016 | K017 | K018 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 3 | 7 | 2 | 7 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| K019 | K020 | K021 | K022 | K023 | K024 | K025 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 8 Lanro | Ko47 | SAT |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Rand- einschnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 8 Lanro | Ko47 | SAT |

Bemerkungen:

Sehr früher Kohlrabi der sich deutlich von Trero unterscheidet, unbedingt erhalten. Ramschen mit RAC 89.6409

Erhaltungstatus: B

Empfehlungen:

Ramschen mit RAC 89.6409



Blattspreite:


| KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 3 | 7 | 2 | 7 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 | KO25 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 9 Lanro | Handelssorte | Wyss |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Rand- einschnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 9 Lanro | Handelssorte | Wyss |

Bemerkungen:

Handelssorte. Es sind keine Unterschiede deutlich geworden zu den beiden anderen Akzessionen von RAC und SAT.

Erhaltungstatus: D

Empfehlungen:

Sorte noch im Handel erhältlich.



Blattspreite:

| K015 | K016 | K017 | K018 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 3 | 7 | 2 | 7 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| K019 | K020 | K021 | K022 | K023 | K024 | K025 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 |

Sortenblätter

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 10 Delikatesse violett | 89.6396 | RAC |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Randein- schnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |

Sortenblätter

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 10 Delikatesse violett | 89.6396 | RAC |

Bemerkungen:

Spätreifer Sommerkohlrabi, grosse Knollen die kurze Zeit Lagerfähig sind, erhaltenswert. Unterscheidet sich von den übrigen Delikatess in 10 Descriptoren.

Erhaltungstatus: A

Empfehlungen:

Als eigenständige Sorte erhalten.



Blattspreite:

| KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 1 | 7 | 2 | 7 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 | KO25 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 |

Sortenblätter

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 11 Delikatess weiss | 89.6395 | RAC |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Rand- einschnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |

Sortenblätter

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 11 Delikatess weiss | 89.6395 | RAC |

Bemerkungen:

Weisser später Sommerkohlrabi, unbedingt erhalten.

Erhaltungstatus: A

Empfehlungen:

Als eigenständige Sorte erhalten.



Blattspreite:

| KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 5 | 7 | 2 | 7 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 | KO25 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 |

Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 12 Delikatess blauer | GE-1291 | PSR |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Rand- einschnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 |

Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 12 Delikatess blauer | GE-1291 | PSR |

Bemerkungen:

Spätreifer Sommerkohlrabi, grosse Knollen die kurze Zeit Lagerfähig sind. Unterscheidet sich von den übrigen deutlich.

Erhaltungstatus: A

Empfehlungen:

Als eigenständige Sorte erhalten.



Blattspreite:

| KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 5 | 7 | 3 | 9 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 | KO25 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Frankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 |

Sortenblätter

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 13 Blaril (Hädrich) | Ko40 | SAT |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 9 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Rand- einschnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Sortenblätter

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 13 Blaril (Hädrich) | Ko40 | SAT |

Bemerkungen:

Herbstkohlrabi, spätreif und gute Lagerfähigkeit. Hoher Zuchtwert.

Erhaltungstatus: A

Empfehlungen:

Als eigenständige Sorte erhalten.



Blattspreite:

| KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 5 | 7 | 3 | 9 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 | KO25 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 14 Dyna | Ko48 | SAT |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Rand- einschnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 14 Dyna | Ko48 | SAT |

Bemerkungen:

Grosser und spätreifer Lagerkohlrabi für den Herbstanbau. Hoher Züchtungswert.

Erhaltungstatus: A

Empfehlungen:

Als eigenständige Sorte erhalten.



Blattspreite:

| KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 7 | 5 | 2 | 5 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 | KO25 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 15 Superschmelz | Handelssorte | Wyss |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Rand- einschnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |

Sortenblätter

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 15 Superschmelz | Handelssorte | Wyss |

Bemerkungen:

Starkwüchsiger später Sommer- bis Herbstkohlrabi, als eigenständige Sorte erhalten. Unbedingt absichern, dass die Sorte nicht verloren geht.

Erhaltungstatus: D

Empfehlungen:

Sorte noch im Handel erhältlich.



Blattspreite:

| KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 7 | 5 | 2 | 5 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 | KO25 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 |

Sortenblätter

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 23 Delikatesse blauer | 17029 | Artha |



Keimpflanze:

Blattspreite:

| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Keimpflanze: Anthocyan- färbung der Keimblätter | Keimpflanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | Blattstiele: Überschlag- gen | Blattstiel: Länge | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | Blattstiel: Haltung | Blattspreite: Haltung |
| 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht |
| 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 |

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 | KO12 | KO13 | KO14 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Blattsprei- te: Länge | Blattsprei- te: Breite | Blattsprei- te: Form des oberen Teils | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | Blattspreite: Anzahl Randein- schitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Tiefe der Rand- einschnitte (am oberen Teil des Blattes) | Blattspreite: Form im Quer- schnitt |
| 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abge- rundet | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex |
| 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 |

Sortenblätter

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Kohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 23 Delikatesse blauer | 17029 | Artha |

Bemerkungen:

Eigenständige Sorte mit hohem Stiel unterhalb der Knolle, Frühreif und geeignet für Zucht.

Erhaltungstatus: A

Empfehlungen:

Als eigenständige Sorte erhalten.



Blattspreite:

| KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|---|---|
| Blattspreite: Blasigkeit | Blattspreite: Wachsschicht | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenighell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel |
| 5 | 7 | 3 | 9 |

Kohlrabi, Stengelknolle:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 | KO25 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | Kohlrabi: Farbe der Haut | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | Kohlrabi: Form des oberen Endes | Erntereife | Krankheitsanfälligkeit | Marktwert |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch |
| 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 |

Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 16 Du Brassus | 87.5639 | RAC |



| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Blatt: Grünfärbung | Blatt: Intensität der Bereifung | Blatt: Lappung | Mit gelapptem Blatt: Anzahl Lappen | Mit gelapptem Blatt: Länge des Lappens | Mit gelapptem Blatt: Breite des Endlappens | Blatt: Länge |
| 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang |
| 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 |

Blatt:

Blattstiel:

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 |
|---|--|---|--|
| Blatt: Breite | Blatt: Wellung des Randes | Blattstiel: Haltung | Blattstiel: Dicke |
| 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 1-9: 1 fehlend oder sehr gering, 3 gering, 5 mittel, 7 stark, 9 sehr stark | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick |
| 5 | 3 | 1 | 7 |



Rübe:

| KO12 | KO13 |
|---|---|
| Rübe: überwiegende Farbe der Haut oberhalb des Bodens. | Rübe: Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens. |
| 3-7: 3 grün, 5 bronze, 7 rötlichpurpur | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden |
| 3 | 1 |



Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 16 Du Brassus | 87.5639 | RAC |


Bemerkungen:

Gelber Bodenkohlrabi, wüchsig und gut im Ertrag, Fleisch gelb, gesundes Blatt.

Erhaltungstatus: A

Empfehlungen:

Als eigenständige Sorte erhalten.



Rübe:

| KO14.1 | KO14.2 | KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|--|--|--|--|
| Nur Sorten mit grüner oder bronzefarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Nur Sorten mit rötlich-purpurfarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Rübe: überwiegende Farbe der Haut im Boden | Rübe: Form im Längsschnitt | Rübe: Länge | Rübe: Durchmesser |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-4: 1 weiss, 2 gelb, 3 orange rosa, 4 rötlich | 1-5: 1 quer elliptisch, 2 kreisförmig, 3 verkehrt eiförmig, 4 quadratisch, 5 rechteckig | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |

Pseudostamm:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Pseudostamm: Länge | Pseudostamm: Anthocyanfärbung zwischen den Blattnarben | Rübe: Farbe des Fleisches | Rübe: Intensität der Gelbfärbung des Fleisches | Blüte: Erzeugung von Pollen | Krankheitsanfälligkeit |
| 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 1-2: 1 fehlend oder teilweise vorhanden, 2 einheitlich vorhanden | 1-2: 1 weiss, 2 gelb | 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel Üb'h | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark |
| 5 | 1 | 2 | 5 | fehlt | 3 |

Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 17 Perfektion | 89.6398 | RAC |



| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Blatt: Grünfärbung | Blatt: Intensität der Bereifung | Blatt: Lappung | Mit gelapptem Blatt: Anzahl Lappen | Mit gelapptem Blatt: Länge des Lappens | Mit gelapptem Blatt: Breite des Endlappens | Blatt: Länge |
| 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang |
| 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 |

Blatt:

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 |
|---|--|---|--|
| Blatt: Breite | Blatt: Wellung des Randes | Blattstiel: Haltung | Blattstiel: Dicke |
| 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 1-9: 1 fehlend oder sehr gering, 3 gering, 5 mittel, 7 stark, 9 sehr stark | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick |
| 7 | 3 | 1 | 7 |



Rübe:

| KO12 | KO13 |
|---|---|
| Rübe: überwiegende Farbe der Haut oberhalb des Bodens. | Rübe: Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens. |
| 3-7: 3 grün, 5 bronze, 7 rötlichpurpur | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden |
| 3 | 1 |



Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 17 Perfektion | 89.6398 | RAC |

Bemerkungen:

Bildet zum Teil seitliche Austriebe, gelbe Farbe, sehr ähnlich wie Gelbe Schmalz, du Brassus und Jaune Buerre.

Erhaltungstatus: A

Empfehlungen:

Als eigenständige Sorte erhalten.



Rübe:

| KO14.1 | KO14.2 | KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|--|--|--|--|
| Nur Sorten mit grüner oder bronzefarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Nur Sorten mit rötlich-purpurfarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Rübe: überwiegende Farbe der Haut im Boden | Rübe: Form im Längsschnitt | Rübe: Länge | Rübe: Durchmesser |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-4: 1 weiss, 2 gelb, 3 orange rosa, 4 rötlich | 1-5: 1 quer elliptisch, 2 kreisförmig, 3 verkehrt eiförmig, 4 quadratisch, 5 rechteckig | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |

Pseudostamm:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 |
|--|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Pseudostamm: Länge | Pseudostamm: Anthocyanfärbung zwischen den Blattnarben | Rübe: Farbe des Fleisches | Rübe: Intensität der Gelbfärbung des Fleisches | Blüte: Erzeugung von Pollen | Krankheitsanfälligkeit |
| 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 1-2: 1 fehlend oder teilweise vorhanden, 2 einheitlich vorhanden | 1-2: 1 weiss, 2 gelb | 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel Üb'h | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark |
| 5 | 1 | 2 | 7 | fehlt | 3 |

Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 18 Oestgota | 89.6353 | RAC |



| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Blatt: Grünfärbung | Blatt: Intensität der Bereifung | Blatt: Lappung | Mit gelapptem Blatt: Anzahl Lappen | Mit gelapptem Blatt: Länge des Lappens | Mit gelapptem Blatt: Breite des Endlappens | Blatt: Länge |
| 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang |
| 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 |

Blatt:

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 |
|---|--|---|--|
| Blatt: Breite | Blatt: Wellung des Randes | Blattstiel: Haltung | Blattstiel: Dicke |
| 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 1-9: 1 fehlend oder sehr gering, 3 gering, 5 mittel, 7 stark, 9 sehr stark | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick |
| 3 | 5 | 1 | 3 |



Rübe:

| KO12 | KO13 |
|---|---|
| Rübe: überwiegende Farbe der Haut oberhalb des Bodens. | Rübe: Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens. |
| 3-7: 3 grün, 5 bronze, 7 rötlichpurpur | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden |
| 3 | 1 |



Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 18 Oestgota | 89.6353 | RAC |

Bemerkungen:

Eigenständige gelbe Sorte mit schöner Form und gutem Aroma. Als Sorte erhalten. Zum Teil innen faulig oder hohl.

Erhaltungstatus: A

Empfehlungen:

Als eigenständige Sorte erhalten.



Rübe:

| KO14.1 | KO14.2 | KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|--|--|--|--|
| Nur Sorten mit grüner oder bronzefarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Nur Sorten mit rötlich-purpurfarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Rübe: überwiegende Farbe der Haut im Boden | Rübe: Form im Längsschnitt | Rübe: Länge | Rübe: Durchmesser |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-4: 1 weiss, 2 gelb, 3 orange rosa, 4 rötlich | 1-5: 1 quer elliptisch, 2 kreisförmig, 3 verkehrt eiförmig, 4 quadratisch, 5 rechteckig | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 |

Pseudostamm:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Pseudostamm: Länge | Pseudostamm: Anthocyanfärbung zwischen den Blattnarben | Rübe: Farbe des Fleisches | Rübe: Intensität der Gelbfärbung des Fleisches | Blüte: Erzeugung von Pollen | Krankheitsanfälligkeit |
| 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 1-2: 1 fehlend oder teilweise vorhanden, 2 einheitlich vorhanden | 1-2: 1 weiss, 2 gelb | 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel Üb'h | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark |
| 3 | 1 | 2 | 5 | fehlt | 5 |

Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 19 Jaune Beurre | 89.6407 | RAC |



| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Blatt: Grünfärbung | Blatt: Intensität der Bereifung | Blatt: Lappung | Mit gelapptem Blatt: Anzahl Lappen | Mit gelapptem Blatt: Länge des Lappens | Mit gelapptem Blatt: Breite des Endlappens | Blatt: Länge |
| 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang |
| 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 |

Blatt:

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 |
|---|--|---|--|
| Blatt: Breite | Blatt: Wellung des Randes | Blattstiel: Haltung | Blattstiel: Dicke |
| 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 1-9: 1 fehlend oder sehr gering, 3 gering, 5 mittel, 7 stark, 9 sehr stark | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick |
| 7 | 5 | 1 | 3 |



Rübe:

| KO12 | KO13 |
|---|---|
| Rübe: überwiegende Farbe der Haut oberhalb des Bodens. | Rübe: Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens. |
| 3-7: 3 grün, 5 bronze, 7 rötlichpurpur | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden |
| 3 | 1 |



Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 19 Jaune Beurre | 89.6407 | RAC |

Bemerkungen:

Gelber Bodenkohlrabi mit Eigenschaften und Aussehen wie Perfektion und Gelbe Schmalz.

Erhaltungstatus: A

Empfehlungen:

Als eigenständige Sorte erhalten.



Rübe:

| KO14.1 | KO14.2 | KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|--|--|--|--|
| Nur Sorten mit grüner oder bronzefarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Nur Sorten mit rötlich-purpurfarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Rübe: überwiegende Farbe der Haut im Boden | Rübe: Form im Längsschnitt | Rübe: Länge | Rübe: Durchmesser |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-4: 1 weiss, 2 gelb, 3 orange rosa, 4 rötlich | 1-5: 1 quer elliptisch, 2 kreisförmig, 3 verkehrt eiförmig, 4 quadratisch, 5 rechteckig | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |

Pseudostamm:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 |
|--|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Pseudostamm: Länge | Pseudostamm: Anthocyanfärbung zwischen den Blattnarben | Rübe: Farbe des Fleisches | Rübe: Intensität der Gelbfärbung des Fleisches | Blüte: Erzeugung von Pollen | Krankheitsanfälligkeit |
| 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 1-2: 1 fehlend oder teilweise vorhanden, 2 einheitlich vorhanden | 1-2: 1 weiss, 2 gelb | 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel Üb'h | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark |
| 3 | 1 | 2 | 7 | fehlt | 3 |

Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 20 Gelb | GE-1576 | PSR |



| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Blatt: Grünfärbung | Blatt: Intensität der Bereifung | Blatt: Lappung | Mit gelapptem Blatt: Anzahl Lappen | Mit gelapptem Blatt: Länge des Lappens | Mit gelapptem Blatt: Breite des Endlappens | Blatt: Länge |
| 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang |
| 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 |

Blatt:

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 |
|---|--|---|--|
| Blatt: Breite | Blatt: Wellung des Randes | Blattstiel: Haltung | Blattstiel: Dicke |
| 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 1-9: 1 fehlend oder sehr gering, 3 gering, 5 mittel, 7 stark, 9 sehr stark | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick |
| 5 | 7 | 1 | 5 |



Rübe:

| KO12 | KO13 |
|---|---|
| Rübe: überwiegende Farbe der Haut oberhalb des Bodens. | Rübe: Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens. |
| 3-7: 3 grün, 5 bronze, 7 rötlichpurpur | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden |
| 3 | 1 |



Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 20 Gelb | GE-1576 | PSR |

Bemerkungen:

Uneinheitliche Sorte mit vielen gespaltenen und unförmigen Knollen (Bild links und unten). Geringer Marktwert und wenig Züchterpotenzial.

Erhaltungstatus: A

Empfehlungen:

Als eigenständige Sorte erhalten.



Rübe:

| KO14.1 | KO14.2 | KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|--|--|--|--|
| Nur Sorten mit grüner oder bronzefarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Nur Sorten mit rötlich-purpurfarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Rübe: überwiegende Farbe der Haut im Boden | Rübe: Form im Längsschnitt | Rübe: Länge | Rübe: Durchmesser |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-4: 1 weiss, 2 gelb, 3 orange rosa, 4 rötlich | 1-5: 1 quer elliptisch, 2 kreisförmig, 3 verkehrt eiförmig, 4 quadratisch, 5 rechteckig | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |

Pseudostamm:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 |
|--|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Pseudostamm: Länge | Pseudostamm: Anthocyanfärbung zwischen den Blattnarben | Rübe: Farbe des Fleisches | Rübe: Intensität der Gelbfärbung des Fleisches | Blüte: Erzeugung von Pollen | Krankheitsanfälligkeit |
| 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 1-2: 1 fehlend oder teilweise vorhanden, 2 einheitlich vorhanden | 1-2: 1 weiss, 2 gelb | 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel Üb'h | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark |
| 3 | 1 | 2 | 5 | fehlt | 3 |

Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 21 Blanc dur d'hiver | GE-1163 | PSR |



| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Blatt: Grünfärbung | Blatt: Intensität der Bereifung | Blatt: Lappung | Mit gelapptem Blatt: Anzahl Lappen | Mit gelapptem Blatt: Länge des Lappens | Mit gelapptem Blatt: Breite des Endlappens | Blatt: Länge |
| 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 |

Blatt:

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 |
|---|--|---|--|
| Blatt: Breite | Blatt: Wellung des Randes | Blattstiel: Haltung | Blattstiel: Dicke |
| 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 1-9: 1 fehlend oder sehr gering, 3 gering, 5 mittel, 7 stark, 9 sehr stark | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick |
| 3 | 7 | 1 | 3 |



Rübe:

| KO12 | KO13 |
|---|---|
| Rübe: überwiegende Farbe der Haut oberhalb des Bodens. | Rübe: Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens. |
| 3-7: 3 grün, 5 bronze, 7 rötlichpurpur | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden |
| 3 | 1 |



Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 21 Blanc dur d'hiver | GE-1163 | PSR |

Bemerkungen:

Hier handelt es sich um eine Herbsträbe. Sie ist länglich, in einen Spitz zulaufend und von geringem Marktwert. Anfällig auf Schwarzbeinigkeit.

Erhaltungstatus: C + G

Empfehlungen:

Akzession streichen



Rübe:

| KO14.1 | KO14.2 | KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|--|--|--|--|
| Nur Sorten mit grüner oder bronzefarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Nur Sorten mit rötlich-purpurfarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Rübe: überwiegende Farbe der Haut im Boden | Rübe: Form im Längsschnitt | Rübe: Länge | Rübe: Durchmesser |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-4: 1 weiss, 2 gelb, 3 orange rosa, 4 rötlich | 1-5: 1 quer elliptisch, 2 kreisförmig, 3 verkehrt eiförmig, 4 quadratisch, 5 rechteckig | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |

Pseudostamm:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Pseudostamm: Länge | Pseudostamm: Anthocyanfärbung zwischen den Blattnarben | Rübe: Farbe des Fleisches | Rübe: Intensität der Gelbfärbung des Fleisches | Blüte: Erzeugung von Pollen | Krankheitsanfälligkeit |
| 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 1-2: 1 fehlend oder teilweise vorhanden, 2 einheitlich vorhanden | 1-2: 1 weiss, 2 gelb | 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel Üb'h | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark |
| 3 | 1 | 2 | 3 | fehlt | 3 |

Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 22 Gelbe Schmalz | Handelssorte | Bigler |



| KO1 | KO2 | KO3 | KO4 | KO5 | KO6 | KO7 |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Blatt: Grünfärbung | Blatt: Intensität der Bereifung | Blatt: Lappung | Mit gelapptem Blatt: Anzahl Lappen | Mit gelapptem Blatt: Länge des Lappens | Mit gelapptem Blatt: Breite des Endlappens | Blatt: Länge |
| 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |

Blatt:

| KO8 | KO9 | KO10 | KO11 |
|---|--|---|--|
| Blatt: Breite | Blatt: Wellung des Randes | Blattstiel: Haltung | Blattstiel: Dicke |
| 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | 1-9: 1 fehlend oder sehr gering, 3 gering, 5 mittel, 7 stark, 9 sehr stark | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick |
| 5 | 3 | 1 | 3 |



Rübe:

| KO12 | KO13 |
|---|---|
| Rübe: überwiegende Farbe der Haut oberhalb des Bodens. | Rübe: Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens. |
| 3-7: 3 grün, 5 bronze, 7 rötlichpurpur | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden |
| 3 | 1 |



Sortenblätter

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Accenname: | | |
| Bodenkohlrabi | Accennummer: | Geberorganisation: |
| 22 Gelbe Schmalz | Handelssorte | Bigler |

Bemerkungen:

Gute und sichere Sorte mit gelbem Fleisch. Handelssorte

Erhaltungstatus: D

Empfehlungen:

Sorte noch im Handel erhältlich.



Rübe:

| KO14.1 | KO14.2 | KO15 | KO16 | KO17 | KO18 |
|---|---|--|--|--|--|
| Nur Sorten mit grüner oder bronzefarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Nur Sorten mit rötlich-purpurfarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | Rübe: überwiegende Farbe der Haut im Boden | Rübe: Form im Längsschnitt | Rübe: Länge | Rübe: Durchmesser |
| 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | 1-4: 1 weiss, 2 gelb, 3 orange rosa, 4 rötlich | 1-5: 1 quer elliptisch, 2 kreisförmig, 3 verkehrt eiförmig, 4 quadratisch, 5 rechteckig | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |

Pseudostamm:

| KO19 | KO20 | KO21 | KO22 | KO23 | KO24 |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Pseudostamm: Länge | Pseudostamm: Anthocyanfärbung zwischen den Blattnarben | Rübe: Farbe des Fleisches | Rübe: Intensität der Gelbfärbung des Fleisches | Blüte: Erzeugung von Pollen | Krankheitsanfälligkeit |
| 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | 1-2: 1 fehlend oder teilweise vorhanden, 2 einheitlich vorhanden | 1-2: 1 weiss, 2 gelb | 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel Üb'h | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark |
| 7 | 1 | 2 | 3 | fehlt | 3 |

5.2 Bewertungskriterien nach UPOV Richtlinien TG/65/4

Bewertungskriterien Kohlrabi Sichtung 2011

| Code für NDB | Feldname | English Name | deutscher Name | fran. Name | Datentyp | Eigenschaften deutsch |
|--|----------|---|----------------|------------|---|-----------------------|
| Deskriptoren Kohlrabi: Brassica napus var. napobrassica | | | | | | |
| KO1 | | Keimpflanze: Anthocyantfärbung der Keimblätter | | Zahl | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | |
| KO2 | | Keimpflanze: Intensität der Grüntfärbung der Keimblätter | | Zahl | 3-7: 1 hell, 3 mittel, 5 dunkel | |
| KO3 | | Blattsfeile: Überschlagen | | Zahl | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | |
| KO4 | | Blattsfeile: Länge | | Zahl | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | |
| KO5 | | Blattsfeile: Dicke (in der Mitte) | | Zahl | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | |
| KO6 | | Blattsfeile: Haltung | | Zahl | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | |
| KO7 | | Blattspreite: Haltung | | Zahl | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | |
| KO8 | | Blattspreite: Länge | | Zahl | 1-9: 1 sehr kurz, 3 kurz, 5 mittel, 7 lang, 9 sehr lang | |
| KO9 | | Blattspreite: Breite | | Zahl | 1-9: 1 sehr schmal, 3 schmal, 5 mittel, 7 breit, 9 sehr breit | |
| KO10 | | Blattspreite: Form des oberen Teils | | Zahl | 1-5: 1 schmal spitz, 2 spitz, 3 stumpf, 4 abgerundet, 5 breit abgerundet | |
| KO11 | | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | | Zahl | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | |
| KO12 | | Blattspreite: Anzahl Randeinschnitte (am oberen Teil des Blattes) | | Zahl | 1-9: 1 fehlend oder sehr wenige, 3 wenige, 5 mittel, 7 viele, 9 sehr viele | |
| KO13 | | Blattspreite: Tiefe der Randeinschnitte (am oberen Teil des Blattes) | | Zahl | 1-9: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief, 9 sehr tief | |
| KO14 | | Blattspreite: Form im Querschnitt | | Zahl | 1-3: 1 konkav, 2 eben, 3 konvex | |
| KO15 | | Blattspreite: Blasigkeit | | Zahl | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | |
| KO16 | | Blattspreite: Wachsschicht | | Zahl | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | |
| KO17 | | Blattspreite: Ton der Grüntfärbung | | Zahl | 1-3: 1 fehlend, 2 gräulich, 3 bläulich | |
| KO18 | | Blattspreite: Intensität der Grüntfärbung | | Zahl | 1-9: 1 sehr hell, 3 wenig hell, 5 mittel, 7 dunkel, 9 sehr dunkel | |
| KO19 | | Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | | Zahl | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 gross | |
| KO20 | | Kohlrabi: Farbe der Haut | | Zahl | 1-4: 1 weissgrün, 2 grün, 3 hellviolett, 4 dunkelviolett | |
| KO21 | | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | | Zahl | 1-5: 1 quer schmal elliptisch, 2 quer elliptisch, 3 quer breit elliptisch, 4 rund, 5 breit elliptisch | |
| KO22 | | Kohlrabi: Form des oberen Endes | | Zahl | 3-7: 3 eingesunken, 5 eben, 7 vorgewölbt | |
| KO23 | | Erntereife | | Zahl | 1-9: 1 sehr früh, 3 früh, 5 mittel, 7 spät, 9 sehr spät | |
| KO24 | | Krankheitsanfälligkeit | | Zahl | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | |
| KO25 | | Marktwert | | Zahl | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 hoch | |
| KO26 | | Bemerkungen | | | | |

5.3 Bewertungskriterien nach UPOV Richtlinien TG/89/6

Bewertungskriterien Bodenkohlrabi Sichtung 2011

| Code für NDB | Feldname | English Name | deutscher Name | fran. Name | Datentyp | Eigenschaften deutsch |
|---|--|--------------|----------------|------------|---|--------------------------|
| Deskriptoren Bodenkohlrabi; Brassica napus | | | | | | |
| KO1 | Blatt: Grünfärbung | | | Zahl | 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel | |
| KO2 | Blatt: Intensität der Bereifung | | | Zahl | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | |
| KO3 | Blatt: Lappung | | | Zahl | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | |
| KO4 | Mit gelapptem Blatt: Anzahl Lappen | | | Zahl | 1-2: 1 fehlend, 2 vorhanden | |
| KO5 | Mit gelapptem Blatt: Länge des Lappens | | | Zahl | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | |
| KO6 | Mit gelapptem Blatt: Breite des Endlappens | | | Zahl | 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | |
| KO7 | Blatt: Länge | | | Zahl | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | |
| KO8 | Blatt: Breite | | | Zahl | 3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit | |
| KO9 | Blatt: Wellung des Randes | | | Zahl | 1-9: 1 fehlend oder sehr gering, 3 gering, 5 mittel, 7 stark, 9 sehr stark | |
| KO10 | Blattsitel: Haltung | | | Zahl | 1-5: 1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht | |
| KO11 | Blattsitel: Dicke | | | Zahl | 3-7: 3 dünn, 5 mittel, 7 dick | |
| KO12 | Rübe: überwiegende Farbe der Haut oberhalb des Bodens | | | Zahl | 3-7: 3 grün, 5 bronze, 7 rötlichpurpur | |
| KO13 | Rübe: Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | | | Zahl | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | |
| KO14.1 | Nur Sorten mit grüner oder bronzefarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | | | Zahl | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | |
| KO14.2 | Nur Sorten mit rötlichpurpurfarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | | | Zahl | 3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark | |
| KO15 | Rübe: überwiegende Farbe der Haut im Boden | | | Zahl | 1-4: 1 weiss, 2 gelb, 3 orange rosa, 4 rötlich | |
| KO16 | Rübe: Form im Längsschnitt | | | Zahl | 1-5: 1 quer elliptisch, 2 kreisförmig, 3 verkehrt eiförmig, 4 quadratisch, 5 rechteckig | |
| KO17 | Rübe: Länge | | | Zahl | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | |
| KO18 | Rübe: Durchmesser | | | Zahl | 3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross | |
| KO19 | Pseudostamm: Länge | | | Zahl | 3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang | |
| KO20 | Pseudostamm: Anthocyanfärbung zwischen den Blattnarben | | | Zahl | 1-2: 1 fehlend oder teilweise vorhanden, 2 einheitlich vorhanden | |
| KO21 | Rübe: Farbe des Fleisches | | | Zahl | 1-2: 1 weiss, 2 gelb | |
| KO22 | Rübe: Intensität der Gelbfärbung des Fleisches | | | Zahl | 3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel | |
| KO23 | Blüte: Erzeugung von Pollen | | | Zahl | 1-9: 1 fehlend, 9 vorhanden | |
| KO24 | Krankheitsanfälligkeit | | | Zahl | 3-5: 3 wenig, 5 mittel, 7 stark | |
| KO25 | Marktwert | | | Text | | |
| KO26 | Bemerkungen | | | Text | | |

5.4 Bonituren Kohlrabi



Bonitierung der Kohlrabi Sichtung 2011

Aussaat: 17. Mai 2011

Pikiert: 23. Mai 2011

gepflanzt: 15. Juni 2011

bonitiert:

| | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | Azur Star | Blaro Roggli | Blaro Roggli | Blaro Roggli | Blaro Roggli | Trero (Hä) | Trero | Blaro | Blaro | Blaro Roggli | |
| Sorte | Ko44 | 89.6397 | GE-1981 | 98.6410 | Ko45 | 98.6410 | 98.6410 | 98.6410 | 98.6410 | 98.6410 | 98.6410 | 98.6410 | 98.6410 | 98.6410 | 98.6410 | 98.6410 | |
| Accennumb: | SAT | RAC | PSR | WYSS | SAT | RAC | WYSS | WYSS | WYSS | PSR | RAC | RAC | RAC | RAC | RAC | RAC | |
| Herkunft: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K01 | Keimplanze: Anthocyanfärbung der Keimblätter | 1-9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| K02 | Keimplanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | 3-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| K03 | Blattstiele: Überschlagen | 1-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K04 | Blattstiel: Länge | 1-9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K05 | Blattstiel: Dicke (in der Mitte) | 3-7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| K06 | Blattstiel: Haltung | 1-5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| K07 | Blattspreite: Haltung | 1-5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| K08 | Blattspreite: Länge | 1-9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| K09 | Blattspreite: Breite | 1-9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| K10 | Blattspreite: Form des oberen Teils | 1-5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| K11 | Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | 1-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K12 | Blattspreite: Anzahl Randeinschnitte (am oberen Teil des Blattes) | 1-9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| K13 | Blattspreite: Tiefe der Randeinschnitte (am oberen Teil des Blattes) | 1-9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| K14 | Blattspreite: Form im Querschnitt | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K15 | Blattspreite: Blasigkeit | 3-7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| K16 | Blattspreite: Wachsschicht | 3-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| K17 | Blattspreite: Ton der Grünfärbung | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| K18 | Blattspreite: Intensität der Grünfärbung | 1-9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| K19 | Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | 3-7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| K20 | Kohlrabi: Farbe der Haut | 1-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| K21 | Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | 1-5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K22 | Kohlrabi: Form des oberen Endes | 3-7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| K23 | Erntereife | 1-9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| K24 | Krankheitsanfälligkeit | 1-9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| K25 | Marktwert | 1-9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| K26 | Bemerkungen | | | | | | | | | | | | | | | | |

5.4 Bonituren Kohlrabi

Bonitierung der Kohlrabi Sichtung 2011

Aussaat: 17. Mai 2011

Pflücht: 23. Mai 2011

gepflanzt: 15. Juni 2011

bonitiert: Juli - Oktober

| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23 |
|---|---------|-------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|------|--------------|-------------------|
| Sorte | Lanro | Lanro | Lanro | Delikatess violett | Delikatess weiss | Delikatess blauer | Blari (Hädrich) | Dyna | Superschmelz | Delikatess blauer |
| Accennumb: | 89.6409 | Ko47 | Referenzsort | 89.6396 | 89.6395 | GE-1291 | Ko40 | Ko48 | Referenzsort | 17029 |
| Herkunft: | RAC | SAT | Wyss | RAC | RAC | PSR | SAT | SAT | Wyss | Artha Samen |
| Keimplanze: Anthocyanfärbung der Keimblätter | 1-9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 |
| Keimplanze: Intensität der Grünfärbung der Keimblätter | 3-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| Blattsiele: Überschlagen | 1-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Blattsiel: Länge | 1-9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Blattsiel: Dicke (in der Mitte) | 3-7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Blattsiel: Haltung | 1-5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blattspreite: Haltung | 1-5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Blattspreite: Länge | 1-9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 |
| Blattspreite: Breite | 1-9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Blattspreite: Form des oberen Teils | 1-5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Blattspreite: Einschnitte bis zur Mittelrippe (am unteren Teil des Blattes) | 1-9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Blattspreite: Anzahl Randseinschnitte (am oberen Teil des Blattes) | 1-9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Blattspreite: Tiefe der Randseinschnitte (am oberen Teil des Blattes) | 1-9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blattspreite: Form im Querschnitt | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Blattspreite: Blasigkeit | 3-7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Blattspreite: Wachsschicht | 3-7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| Blattspreite: Ton der Grünfärbung | 1-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Blattspreite: Intensität der Grünfärbung | 1-9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 |
| Kohlrabi: Anzahl der inneren Blätter | 3-7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kohlrabi: Farbe der Haut | 1-4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Kohlrabi: Form (im Längsschnitt) | 1-5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Kohlrabi: Form des oberen Endes | 3-7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Erntereife | 1-9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Krankheitsanfälligkeit | 1-9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Marktwert | 1-9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |

5.4 Bonituren Kohlrabi

Kohlrabi Blattmessungen: Blattstiellänge

Blatt

| Nr. | Blattstiel Länge KO4 | 1. Messung | 2. Messung | 3. Messung | 4. Messung | 5. Messung | Mittelwert | Bonitierung |
|-----|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Azur Star | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 7.8 | 3 |
| 2 | Blaro Roggli | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 5.6 | 1 |
| 3 | Blaro Roggli | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.8 | 3 |
| 4 | Blaro | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.6 | 3 |
| 5 | Trero | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 1 |
| 6 | Trero (Hädrich) | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 5.8 | 1 |
| 7 | Lanro | 6.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 10.4 | 5 |
| 8 | Lanro | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 5 |
| 9 | Lanro | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 9.2 | 5 |
| 10 | Delikatesse, violett | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 13.0 | 16.4 | 7 |
| 11 | Delikatesse, weiss | 14.0 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 7 |
| 12 | Delikatesse, blauer | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 16.2 | 7 |
| 13 | Blaril (Hädrich) | 11.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 16.6 | 7 |
| 14 | Dyna | 18.0 | 22.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 9 |
| 15 | Superschmelz | 18.0 | 14.0 | 28.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 9 |
| 23 | Delikatesse, blauer | 14.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 17.8 | 9 |

5.5 Bonituren Bodenkohlrabi

Bonitierung der Bodenkohlrabi Sichtung 2011

Aussaart: 17. Mai 2011

Pikiert: 23. Mai 2011

gepflanzt: 15. Juni 2011

bonitiert: Juli-Oktober



| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|------------|--|------------|--------------------------|--------------|---------|-------------------|---------------|--|
| Sorte | du Brassus | Perfektion | Oestgota | Jaune Beurre | Gelb | Blanc dur d'hiver | Gelbe Schmalz | |
| Accennumb: | 87.5639 | 89.6398 | 89.6353 | 89.6407 | GE-1576 | GE-1163 | Referenzsorte | |
| Herkunft: | RAC | RAC | RAC | RAC | PSR | PSR | Bigler | |
| K01 | Blatt: Grünfärbung | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| K02 | Blatt: Intensität der Bereifung | 3-7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | |
| K03 | Blatt: Lappung | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| K04 | Mit gelapptem Blatt: Anzahl Lappen | 3-7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
| K05 | Mit gelapptem Blatt: Länge des Lappens | 3-7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | |
| K06 | Mit gelapptem Blatt: Breite des Endlappens | 3-7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | |
| K07 | Blatt: Länge | 3-7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | |
| K08 | Blatt: Breite | 3-7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | |
| K09 | Blatt: Wellung des Randes | 1-9 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | |
| K010 | Blattsitel: Haltung | 1-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| K011 | Blattsitel: Dicke | 3-7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| K012 | Rübe: überwiegende Farbe der Haut oberhalb des Bodens | 3-7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| K013 | Rübe: Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | 1-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| K014.1 | Nur Sorten mit grüner oder bronzefarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | 3-7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| K014.2 | Nur Sorten mit rötlichpurpurfarbener Haut: Rübe: Intensität der Anthocyanfärbung der Haut oberhalb des Bodens | 3-7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| K015 | Rübe: überwiegende Farbe der Haut im Boden | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| K016 | Rübe: Form im Längsschnitt | 1-5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| K017 | Rübe: Länge | 3-7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | |
| K018 | Rübe: Durchmesser | 3-7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | |
| K019 | Pseudostamm: Länge | 3-7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| K020 | Pseudostamm: Länge | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| K021 | Rübe: Farbe des Fleisches | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| K022 | Rübe: Intensität der Gelbfärbung des Fleisches | 3-7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | |
| K023 | Blüte: Erzeugung von Pollen | 1-9 | | | | | | |
| K024 | Krankheitsanfälligkeit | 3-5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| K025 | Marktwert | text | gut | gering | Faulig | Faulig | mittel | |
| K026 | Bemerkungen | text | Siehe unter Empfehlungen | | | | | |



5.6 Empfehlungen auf Grundlage der Sichtungsergebnisse

Empfehlung auf Grund der Sichtungsergebnisse



Kohlrabi und Bodenkohlrabi Sichtung 2011

Brassica oleracea ssp. Oleracea convar. Acephala var. gongyloides; Brassica napus ssp. Napobrassica

| Aussaat Nr. | ACCENNUMB | PLCOD | ALCOD | Donneur | Gattung | Sortenname | NBD Nr. | Bemerkungen | Virus Sanierung | Empfehlung |
|-------------|-----------|-------|-------|----------------------|----------|-----------------|---------|--|-----------------|------------|
| 1 | ko44 | | | Sativa | Kohlrabi | Azur Star | | Eigenständige Sorte mit hohem Stiel unterhalb der Knolle, Frühreif und geeignet für Zucht. | keine | A |
| 2 | 89.6397 | | | RAC | Kohlrabi | Blaro Roggli | | Frühe Sorte mit sehr guten Eigenschaften, unbedingt erhalten für die Züchtung wertvoll. Ramschen mit GE-1981. | keine | B |
| 3 | GE-1981 | | | PSR | Kohlrabi | Blaro Roggli | | Frühe Sorte mit sehr guten Eigenschaften, unbedingt erhalten für die Züchtung wertvoll. Ramschen mit RAC 89.6397 | keine | B |
| 4 | Wyss | | | Handel/ Referenzorte | Kohlrabi | Blaro | | Handelsorte, im Erscheinungsbild sehr ähnlich wie die Herkünfte von Roggli RAC und PSR. | keine | D |
| 5 | 98.6410 | | | RAC | Kohlrabi | Trero | | Schöner ovaler und frühreifer Kohlrabi, unbedingt erhalten und Ramschen mit Ko45. | keine | B |
| 6 | Ko45 | | | Sativa | Kohlrabi | Trero (Hädrich) | | Schöner ovaler und frühreifer Kohlrabi, unbedingt erhalten und Ramschen mit RAC 98.6410 | keine | B |
| 7 | 89.6409 | | | RAC | Kohlrabi | Lanro | | Sehr früher Kohlrabi der sich deutlich von Trero unterscheidet, unbedingt erhalten. Ramschen mit Ko47 | keine | B |
| 8 | ko47 | | | Sativa | Kohlrabi | Lanro | | Sehr früher Kohlrabi der sich deutlich von Trero unterscheidet, unbedingt erhalten. Ramschen mit RAC 89.6409 | keine | B |



Anhänge

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|------------------------------|---------------|----------------------|--|--|-------|-------|
| 9 | Wyss | | Handel/ Referenzs orte | Kohlrabi | Lanro | | Handelssorte. Es sind keine Unterschiede deutlich geworden zu den beiden anderen Akzessionen von RAC und SAT. | keine | D |
| 10 | 89.6396 | | RAC | Kohlrabi | Delikatesse, violett | | Spätreifer Sommerkohlrabi, grosse Knollen die kurze Zeit Lagerfähig sind, erhaltenswert. Unterscheidet sich von den übrigen Delikatess in 10 Descriptoren. | keine | A |
| 11 | 89.6395 | | RAC | Kohlrabi | Delikatesse, weiss | | Weisser später Sommerkohlrabi, unbedingt erhalten. | keine | A |
| 12 | GE-1291 | | PSR | Kohlrabi | Delikatesse, blauer | | Spätreifer Sommerkohlrabi, grosse Knollen die kurze Zeit Lagerfähig sind, erhaltenswert. Unterscheidet sich von den übrigen Akzessionen deutlich. | keine | A |
| 13 | ko40 | | Sativa | Kohlrabi | Blaril (Hädrich) | | Herbstkohlrabi, spätreif und gute Lagerfähigkeit. Hoher Zuchtwert. | keine | A |
| 14 | ko48 | | Sativa | Kohlrabi | Dyna | | Grosser und spätreifer Lagerkohlrabi für den Herstanbau. Hoher Züchtungswert. | keine | A |
| 15 | Wyss | | Handel/ Referenzs orte | Kohlrabi | Superschmelz | | Starkwüchsiger später Sommer- bis Herbstkohlrabi, als eigenständige Sorte erhalten. Unbedingt absichern, dass die Sorte nicht verloren geht. | keine | D |
| 16 | 87.5639 | | RAC | Bodenkohlrabi | du Brassus | | Gelber Bodenkohlrabi, wüchsig und gut im Ertrag, Fleisch gelb, gesundes Blatt. | keine | A |
| 17 | 89.6398 | | RAC | Bodenkohlrabi | Perfektion | | Bildet zum Teil seitliche Austriebe, gelbe Farbe, sehr ähnlich wie Gelbe Schmalz, du Brassus und Jaune Beurree. | keine | A |
| 18 | 89.6353 | | RAC | Bodenkohlrabi | Oestgota | | Eigenständige gelbe Sorte mit schöner Form und gutem Aroma. Als Sorte erhalten. Zum Teil innen faulig oder hohl. | keine | A |
| 19 | 89.6407 | | RAC | Bodenkohlrabi | Jaune Beurree | | Gelber Bodenkohlrabi mit Eigenschaften und Aussehen wie Perfektion und Gelbe Schmalz. | keine | A |
| 20 | GE-1576 | | PSR | Bodenkohlrabi | Gelb | | Uneinheitliche Sorte mit vielen gespaltenen und unförmigen Knollen. Geringer Marktwert und wenig Züchterpotenzial. | keine | A |
| 21 | GE-1163 | | PSR | Bodenkohlrabi | Blanc dur d'hiver | | Hier handelt es sich um eine Herbsträbe. Sie ist länglich, in einen Spitz zulaufend und von geringem Marktwert. Anfällig auf Schwarzbeinigkeit. | keine | C + G |
| 22 | Bigler | | Handel/ Referenzs orte | Bodenkohlrabi | Gelbe Schmalz | | Gute und sichere Sorte mit gelbem Fleisch. Handelssorte | keine | D |
| 23 | 17029 | | Artha | Kohlrabi | Delikatesse, blauer | | Spätreifer blauer Kohlrabi von stattlicher Grösse. Starkwüchsig aber innen zart. Er unterscheidet sich in fünf Merkmalen von GE-1291 von PSR. | keine | A |



Anhänge

5.7 Bodenkohlrabi Messung des Endlappens (K05, K06)

Bodenkohlrabi Blattmessungen: Endlappen 2011

Endlappen Länge K05

| Nr. | Länge des Lappens K05 | 1. Messung | 2. Messung | 3. Messung | 4. Messung | 5. Messung | Mittelwert | Bonitierung |
|-----|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 16 | du Brassus | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 15.8 | 3 |
| 17 | Perfektion | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 18.2 | 5 |
| 18 | Oestgota | 20.0 | 21.0 | 16.0 | 22.0 | 17.0 | 19.2 | 7 |
| 19 | Jaune Beurree | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 18.4 | 5 |
| 20 | Gelb | 20.0 | 26.0 | 16.0 | 19.0 | 23.0 | 20.8 | 7 |
| 21 | Blanc dur d'hiver | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 10.4 | 3 |
| 22 | Gelbe Schmalz | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.6 | 5 |

Breite des Endlappens K06

| Nr. | Breite des Endlappens | 1. Messung | 2. Messung | 3. Messung | 4. Messung | 5. Messung | Mittelwert | Bonitierung |
|-----|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 16 | du Brassus | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 3 |
| 17 | Perfektion | 20.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 22.4 | 7 |
| 18 | Oestgota | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 20.0 | 18.6 | 3 |
| 19 | Jaune Beurree | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 22.2 | 7 |
| 20 | Gelb | 21.0 | 24.0 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 20.4 | 5 |
| 21 | Blanc dur d'hiver | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.2 | 3 |
| 22 | Gelbe Schmalz | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 5 |

Länge der Blattspreite mit Stiel (K07, K08, K019)

Bodenkohlrabi Sichtung, Messungen an Blättern, Rübe und Pseudostamm 2011

Blattlänge K07

| Nr. | Blattlänge | 1. Messung | 2. Messung | 3. Messung | 4. Messung | 5. Messung | Mittelwert | Bonitierung |
|-----|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 16 | du Brassus | 41.0 | 42.0 | 57.0 | 48.0 | 52.0 | 48.0 | 3 |
| 17 | Perfektion | 48.0 | 49.0 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 51.2 | 5 |
| 18 | Oestgota | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 7 |
| 19 | Jaune Beurree | 56.0 | 49.0 | 51.0 | 46.0 | 54.0 | 51.2 | 5 |
| 20 | Gelb | 45.0 | 51.0 | 55.0 | 46.0 | 52.0 | 49.8 | 3 |
| 21 | Blanc dur d'hiver | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 42.2 | 3 |
| 22 | Gelbe Schmalz | 55.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 56.0 | 58.2 | 7 |

Blattbreite K08

| Nr. | Blattbreite | 1. Messung | 2. Messung | 3. Messung | 4. Messung | 5. Messung | Mittelwert | Bonitierung |
|-----|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 16 | du Brassus | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 19.6 | 5 |
| 17 | Perfektion | 20.0 | 22.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 23.0 | 7 |
| 18 | Oestgota | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.6 | 3 |
| 19 | Jaune Beurree | 22.0 | 21.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 | 23.8 | 7 |
| 20 | Gelb | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 19.0 | 22.0 | 20.2 | 5 |
| 21 | Blanc dur d'hiver | 20.0 | 23.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 18.2 | 3 |
| 22 | Gelbe Schmalz | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 20.2 | 5 |

Pseudostamm länge K019 kurz 3; mittel 5; lang 7

| Nr. | Pseudostammlänge | 1. Messung | 2. Messung | 3. Messung | 4. Messung | 5. Messung | Mittelwert | Bonitierung |
|-----|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 16 | du Brassus | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 5 |
| 17 | Perfektion | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 5 |
| 18 | Oestgota | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 3 |
| 19 | Jaune Beurree | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 3 |
| 20 | Gelb | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 3 |
| 21 | Blanc dur d'hiver | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 3 |
| 22 | Gelbe Schmalz | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 7 |

Jungpflanzen vor der Pflanzung



Dokumentation im Feld




Blick in die Versuchsanlage





Der Sichtungsgarten im Juli - August





Pflegearbeiten und Bonituren



Geschmacksdegustation

